

BIOCETAMOL-25 % 25 KG

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

CADA KG CONTIENE:

Principio activo:

Paracetamol..... 250 GR

Excipientes:.....750 GR

3- FORMA FARMACÉUTICA

Premezcla medicamentosa.

4- DATOS CLÍNICOS

4.1- Especies de destino

Porcino (lechones destetados).

4.2- Indicaciones de uso, especificando las especies de destino

Cerdos (lechones destetados):

Tratamiento sintomático para reducir la pirexia en el contexto de enfermedades infecciosas respiratorias agudas, en combinación con una terapia anti infecciosa apropiada.

4.3 – Contraindicaciones

- No usar en animales con hipersensibilidad conocida al paracetamol.
 - No usar el medicamento en animales con insuficiencia hepática o renal o con hipovolemia.
- Véase también la sección 4.8.

4.5- Precauciones especiales de uso DOSIS;

Precauciones especiales para su uso en animales

El medicamento es una Premezcla que debe ser administrada a los cerdos después de haber sido mezclada con pienso sólido en una proporción mínima de 3 a 5 kg/tonelada.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales

Las personas con hipersensibilidad conocida al paracetamol deberán evitar el contacto con el pienso medicamentoso. Para evitar el contacto con la piel, mucosas y/u ojos cuando se manipule el pienso medicamentoso se usarán guantes, mascarilla anti polvo aprobada por la UE y gafas protectoras. En caso de que entre en contacto con la piel y/u ojos, lavar inmediatamente con agua abundante. Acudir al médico si, después de la exposición, aparecen signos como exantema cutáneo o irritación ocular persistente.

4.6- Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)

Tras la administración del medicamento a la dosis terapéutica no se han observado reacciones adversas.

4.7- Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta

La seguridad ha quedado demostrada en estudios llevados a cabo en cerdas usando el medicamento a dosis tres veces superiores a las recomendadas.

4.8- Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

Se debe evitar la administración simultánea de fármacos nefrotóxicos.

No se han descrito interacciones con los antibióticos de uso habitual. El tratamiento concomitante deberá valorarse en cada caso individual.

No se ha establecido la seguridad de la administración simultánea del medicamento y un pienso suplementado con vitamina E o ácidos grasos poli insaturados. Usar sólo según una evaluación del beneficio/riesgo realizada por el veterinario responsable.