

# BIO-LINCO 11% 25 KG



## Ficha Técnica del Producto

### Composición:

Lincomicina.....110 gr  
Excipientes, c.s.p.....1,000 gr

### Indicaciones y vía de administración:

Premezcla antibiótica Tipo A de alta eficiencia en polvo, a base de lincosamida para ser utilizada en la elaboración de alimentos balanceados para aves y cerdos, en todas las etapas.

**Cerdos:** Control y tratamiento de la neumonía micoplásmica; prevención de la disentería porcina y enteritis necrótica.

**Aves:** Prevención y control de *Mycoplasma gallisepticum* y *sinoviae*, enteritis necrótica causada por *clostridium p* y otras bacterias gram positivas, tales como *Streptococcus sp*, *Staphylococcus sp*.

### Direcciones de uso cerdos

-Control y tratamiento de la neumonía micoplásmica: Suministrar 55 - 165 ppm de lincomicina (1-3 lb/TC de **Bio-Linco 11%** premix) durante tres semanas de manera continua en el alimento terminado.

-Prevención de la disentería porcina y Enteritis necrótica: Suministrar 55 ppm de lincomicina (1 Lb/TC de **Bio-Linco 11%** premix) en el alimento terminado durante todo el ciclo de producción.

-Tratamiento de la disentería porcina y enteritis necrótica: Suministrar 110 ppm de lincomicina (2 lb/TC de **Bio-Linco 11%** premix) en el alimento terminado durante tres semanas consecutivas. Continuar el tratamiento con 55 ppm de lincomicina (1 lb/TC de **Bio-Linco 11%** premix) en el alimento balanceado durante cuatro semanas.

### Direcciones de uso aves

-Prevención del *Mycoplasma gallisepticum* y *sinoviae*: En gallinas reproductoras, utilizar a razón de 100 -110 ppm de Lincomicina (2 lb/TC de **Bio-Linco 11%** premix) en el alimento terminado en choques intermitentes según programa recomendado por el médico Veterinario.

-Tratamiento *Mycoplasma gallisepticum* y *sinoviae*: Suministrar 110 ppm de lincomicina (2 lb/TC de **Bio-Linco 11%** premix) en el alimento terminado durante 7-10 días.

-Prevención de la enteritis necrótica (Promotor de crecimiento): Suministrar de 33 -39 ppm de lincomicina (0.6 lb/TC a 0.7lb/TC de **Bio-Linco 11%** premix) en el alimento terminado, desde el preiniciador hasta el alimento Finalizador.

-Tratamiento de la enteritis necrótica: Suministrar de 110 ppm de lincomicina (2 Lb/TC de **Bio-Linco 11%** premix) en el alimento terminado, durante siete días.

### Recomendaciones de uso

Para alimentos medicados tipo C (Alimento terminado), donde la dosis de inclusión de **Bio-Linco 11%** premix, sea menor a 4 lb/TC, se recomienda hacer una dilución previa a la adición en el alimento terminado.

### **Período de retiro**

Se recomienda suprimir su uso al menos seis días antes del sacrificio.

### **Advertencias y precauciones**

Utilizar únicamente en las especies indicadas en esta hoja técnica. Cualquier uso inadecuado de este producto, puede ser fatal.

### **Recomendaciones de almacenamiento**

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar y de aditivos no medicados.

### **Presentación**

Fundas de 25 Kg

Para uso veterinario exclusivamente.

Manufacturado y distribuido por  
BIONORT-VET S.R.L  
Licey al medio,  
Santiago Rep. Dom.  
[Tel:809-580-8610](tel:809-580-8610)  
[www.bionortvet.com](http://www.bionortvet.com)

