



Ficha Técnica del Producto

Composición:

Estreptomina..... 35 gr
Amoxicilina HCl.....100 gr
Excipientes, c.s.p.....1,000 gr

Indicaciones y vía de administración:

Premezcla antibiótica Tipo A de alta eficiencia en polvo. Debido a sus componentes es una premezcla antibiótica de amplio espectro y sinérgica. Está diseñada para ser utilizada en la elaboración de alimentos balanceados para aves y cerdos, en todas las etapas, así como núcleos medicados..

Cerdos: Control y tratamiento de *Streptococcus suis*, *staphilococcus spp*, síndrome MMA, enteritis, *Haemophilus parasuis*, necrosis de cola, dermatitis, salmonelosis, rinitis y demás microorganismos sensibles a ambos principios activos.

Aves: Prevención y control de *Mycoplasma gallisepticum* y *sinoviae*; tratamiento de *Streptococcus sp* y *Staphilococcus sp*.

Direcciones de uso cerdos

-Control y tratamiento de *Streptococcus suis*, *staphilococcus*, síndrome MMA, *enteritis*, *Haemophilus parasuis*, necrosis de cola, dermatitis, salmonelosis, rinitis: Suministrar 200 ppm de amoxicilina y 70 de estreptinomicina (4 lb/TC de **Bio-Amox-S** premix) durante dos semanas de manera continua en el alimento terminado.

Direcciones de uso aves

-Prevención y control de *Mycoplasma gallisepticum* y *sinoviae*: En gallinas reproductoras, utilizar a razón de 200 ppm de estreptinomicina (4 lb/TC de **Bio-Amox-S** premix) en el alimento terminado en choques intermitentes según programa recomendado por el médico Veterinario.

-Tratamiento de *Mycoplasma gallisepticum* y *sinoviae*: Suministrar 400 ppm de amoxicilina + 140 ppm de espectinomicina (8 lb/TC de **Bio-Amox-S** premix) en el alimento terminado durante 7-10 días.

-Tratamiento de necrosis de cabeza de fémur causada por *staphilococcus aeureus*: Suministrar de 400 ppm de amoxicilina (8 lb/TC de **Bio-Amoxi-S** premix) en el alimento terminado, durante siete días.

Recomendaciones de uso

Para alimentos medicados tipo C (Alimento terminado), donde la dosis de inclusión de **Bio-Amoxi-S** premix, sea menor a 4 lb/TC, se recomienda hacer una dilución previa a la adición en el alimento terminado.

Período de retiro

Se recomienda suprimir su uso al menos siete días antes del sacrificio.

Advertencias y precauciones

Utilizar únicamente en las especies indicadas en esta hoja técnica. Cualquier uso inadecuado de este producto, puede ser fatal.

Evitar el uso con productos que tengan en su composición, cloranfenicol.

Recomendaciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar y de aditivos no medicados.

Presentación

Funda de 25 Kg

Para uso veterinario exclusivamente.

Manufacturado y distribuido por
BIONORT-VET S.R.L
Licey al medio,
Santiago Rep. Dom.
[Tel:809-580-8610](tel:809-580-8610)
www.bionortvet.com

