



Ficha Técnica del Producto

Composición:

Clortetracilina.....200 gr
Excipientes, c.s.p.....1,000 gr

Indicaciones y vía de administración:

Premezcla antibiótica Tipo A de amplio espectro en presentación microgranulado, a base de clortetracilina cálcica para ser utilizada en la medicación de alimentos balanceados para aves y cerdos, en todas las etapas.

Cerdos: Control tratamiento y prevención de *Streptococcus sp*, *Clostridium sp*, *Haemophilus sp*, *Klebsiella sp* y *Pasteurella Multocida*, *E. Colli*

Aves: Prevención y control de *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma meleagridis*, *Chlamydia psittaci*, *Streptococcus sp*, *Clostridium sp*, *Haemophilus sp*, *Klebsiella sp* y *Pasteurella Multocida*

Direcciones de uso cerdos

-Prevención y control de *Streptococcus en* alimentos preiniciadores: Suministrar de 300 a 400 ppm de clortetracilina (de 3 a 4 lb/TC de **Bio-Clor 20%** premix) durante una semana continua en el alimento terminado.

-Prevención de la disentería porcina y Enteritis necrótica: Suministrar de 300 ppm de clortetracilina (3 lb/TC de **Bioclor 20%** premix) durante siete días de manera continua en el alimento terminado durante la transición de las fases alimenticias.

Direcciones de uso aves

-Prevención del *Mycoplasma gallisepticum* y *sinoviae*: En gallinas reproductoras, utilizar a razón de 400 -600 ppm de Clortetraclina (4 -6 lb/TC de **Bioclor 20%** premix) en el alimento terminado en choques intermitentes según programa recomendado por el médico Veterinario.

-Tratamiento de *Mycoplasma gallisepticum* y *sinoviae*: Suministrar 400 ppm de clortetracilina (4 lb/TC de **Bioclor 20%** premix) en el alimento terminado durante 7-10 días.

-Tratamiento de la enteritis necrótica: Suministrar de 450 ppm de lincomicina (4.5 lb/TC de **Bio-Clor 20%** premix) en el alimento terminado, durante siete días.

Recomendaciones de uso

Para alimentos medicados tipo C (Alimento terminado), donde la dosis de inclusión de **Bio-Clor 20%** premix, sea menor a 4 lb/TC, se recomienda hacer una dilución previa a la adición en el alimento terminado.

Se recomienda considerar el nivel de Calcio de la dieta, previo a utilización.

Período de retiro

Se recomienda suprimir su uso al menos cinco días antes del sacrificio.

Advertencias y precauciones

Utilizar únicamente en las especies indicadas en esta hoja técnica. Cualquier uso inadecuado de este producto, puede ser fatal.

Recomendaciones de almacenamiento


Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar y de aditivos no medicados.

Presentación

Fundas de 25 Kg

Para uso veterinario exclusivamente.

Manufacturado y distribuido por
BIONORT-VET S.R.L
Licey al medio,
Santiago Rep. Dom.
[Tel:809-580-8610](tel:809-580-8610)
www.bionortvet.com



BIOCLOR 20% MICROGRÁNULOS

