

# LEVO-NEO SOLUBLE



## Ficha Técnica del Producto

### Composición:

Neomicina.....300 gr  
Levofloxacin.....150 gr  
Excipientes, c.s.p.....1,000 gr

### Indicaciones y vía de administración:

*Premezcla antibiótica Tipo A de alta eficiencia en polvo. Indicada para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a la neomicina y levofloxacin en aves, cerdos y terneros.*

**Cerdos:** Tratamiento de procesos infecciosos incluidos dentro del complejo respiratorio y gastroentérico porcino, causado por bacterias sensibles a la neomicina y levofloxacin, tales como Mycoplasma Hypopneumoniar, Pasteurella Haemolític, bordetella Brochiseptica y/o Haemophilus Suis.

**Aves:** Tratamiento de infecciones respiratorias y gástricas, causadas por bacterias sensibles a la levofloxacin y neomicina, tales como Mycoplasma Spp, Pasteurella Multocida y E. Coli,

**Becerras:** Tratamiento de neumonías producidas por infecciones bacterianas, sensibles a la neomicina y levofloxacin.

### Direcciones de uso cerdos

-Tratamiento de infecciones respiratorias en cerdos de peso menor a 30 Kg- Suministrar 35 - 70 mg/Kg de peso vivo de Neomicina y 20 mg/Kg de peso vivo de levofloxacin, equivalente a 100-200 gr de producto por barrica de 50 Galones, durante 5 -7 días.

-Tratamiento de infecciones del tracto gastrointestinal en cerdos de peso mayor a 30 Kg: Suministrar 35 - 70 mg/Kg de peso vivo de Neomicina y 20 mg/Kg de peso vivo de levofloxacin, equivalente a 100-200 gr de producto por barrica de 50 Galones.

### Direcciones de uso aves

-Tratamiento de enfermedades respiratorias Suministrar 35 - 70 mg/Kg de peso vivo de Neomicina y 20 mg/Kg de peso vivo de levofloxacin, equivalente a 100-200 gr de

producto por barrica de 50 Galones durante 5 a 7 días.

-Tratamiento de enfermedades respiratorias Suministrar 35 - 70 mg/Kg de peso vivo de Neomicina y 20 mg/Kg de peso vivo de levofloxacin, equivalente a 100-200 gr de producto por barrica de 50 Galones durante 5 a 7 días.

### Direcciones de uso becerros

-*Tratamiento de neumonía:* Suministrar 250 ppm de levofloxacin y 125 ppm de neomicina (2.5 lb/TC de **Levo-Neo**) durante 10-15 días.

### Recomendaciones de uso

Para alimentos medicados tipo C (Alimento terminado), donde la dosis de inclusión de **Levo-Neo** premix, sea menor a 4 lb/TC, se recomienda hacer una dilución previa a la adición en el alimento terminado. Consulte con su médico Veterinario.

### Período de retiro

Se recomienda suprimir su uso al menos siete días antes del sacrificio.

### Advertencias y precauciones

Utilizar únicamente en las especies indicadas en esta hoja técnica. Cualquier uso inadecuado de este producto, puede ser fatal.

### Recomendaciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar y de aditivos no medicados.

No está recomendado para su administración en hembras gestantes o lactantes.

Para uso veterinario exclusivamente.

Manufacturado y distribuido por  
BIONORT-VET S.R.L  
Licey al medio,  
Santiago Rep. Dom.  
[Tel:809-580-8610](tel:809-580-8610)  
[www.bionortvet.com](http://www.bionortvet.com)

