

NEUMOX FORTE 25 KG



Ficha Técnica del Producto

Composición:

Clortetraciclina.....	120 mg
Sulfadiazina.....	120 mg
Trimetoprim.....	50 mg
Bromexina.....	30 mg
Excipientes, c.s.p.....	1,000 mg

Indicaciones y vía de administración:

Combinación diseñada para formar un círculo sinérgico de fortalecimiento estructural y poder trabajar en forma de cadenas continua de antibióticos rompiendo así de forma total con el ciclo de desarrollo bacteriano y curando de forma total las vías y órganos comprometido de una manera más rápida y eficaz, con una regeneración completa de la salud y el desarrollo de sus animales, y proveerle un mejor desempeño productivo y funcional de sus animales

Cerdos: Está indicada para tratar problemas respiratorios crónicos, *Mycoplasma suis*, *Pasterela multocida*, *Haemophilus parasuis*, rinitis, APP. Así mismo diarreas causadas por *E.Coli*, *Salmonella sp.*, *pseudominas sp.*, *Klebsiella pneumoniae*, *Clostridium sp.*, y otras enfermedades de origen infeccioso causados por bacterias gram + y gram – que afectan la salud de los cerdos.

Aves: Tratamiento de enfermedades del sistema respiratorio y digestivo, tales como Coriza, Micoplasma, sinusitis crónica, así como enfermedades infecciosas causadas por *Salmonella sp.*, *Pasteurella spp.*, *Pseudomonas sp.*, y otras bacterias de los grupos gram + y gram – sensible a alguno de los componentes del medicamento.

Direcciones de uso cerdos

-Tratamiento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales de origen infeccioso: Suministrar de 120 -240 ppm de clortetraciclina, 120-240 ppm de sulfadiazina, 40 -80 pm de trimetoprim y 30 – 60 ppm de bromexina.

Direcciones de uso aves

Tratamiento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales de origen infeccioso: Suministrar de 120 -360 ppm de clortetraciclina, 120-360 ppm de sulfadiazina, 40 -120 pm de trimetoprim y 30 – 90 ppm de bromexina durante 4 a 6 días.

Recomendaciones de uso

Se recomienda diluir el contenido de este sobre en 5 litros de agua, previo a su utilización en la cantidad de agua final a medicar.

Período de retiro

Se recomienda suprimir su uso al menos 20 días antes del sacrificio.

Advertencias y precauciones

Utilizar únicamente en las especies indicadas en esta hoja técnica. Cualquier uso inadecuado de este producto, puede ser fatal.

No está recomendado para su utilización en gallinas de postura.

Recomendaciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar y de aditivos no medicados.

Presentación

Funda de 25 Kg

Para uso veterinario exclusivamente.

Manufacturado y distribuido por BIONORT-VET S.R.L
Licey al medio,
Santiago Rep. Dom.
[Tel:809-580-8610](tel:809-580-8610)
www.bionortvet.com

