


TIAMUPORC 10% 25 KG



Ficha Técnica del Producto

Composición:

Tiamulina.....100 gr
Excipientes, c.s.p.....1,000 gr

Indicaciones y vía de administración:

Premezcla antibiótica Tipo A de alta eficiencia en polvo, a base de tiamulina, dirigida al tratamiento de infecciones causadas por mycoplasma sp y otros microorganismos susceptibles a la tiamulina.

Cerdos: Control y tratamiento de infecciones causadas por Haemophylus sp., mycoplasmas sp, ileitis, clostriosis y otras enfermedades de origen bacteriano sensibles a tiamulina.

Aves: Prevención y control de Mycoplasma Gallisepticum.

Direcciones de uso cerdos

- Control y tratamiento de infecciones causadas por Haemophylus sp., mycoplasmas sp: Suministrar de 100 ppm de tiamulina (2 lb/TC de **Tiamuporc 10%** premix) durante 5 a 7 días en el alimento terminado.

- Prevención de infecciones respiratorias: Suministrar de 50 ppm de tiamulina (1 lb/TC de **Tiamuporc 10%** premix) durante 5 a 7 días en el alimento terminado en etapas de estrés del animal.

Direcciones de uso aves

-Prevención y control de *Mycoplasma Gallisepticum* en gallinas reproductoras y programas de ponedoras en etapa de levante: Suministrar de 200 ppm de tiamulina (4 lb/TC **Tiamuporc 10%**) en el alimento terminado durante períodos de choque de 5 a 7 diseñados por el médico veterinario.

-Prevención y control de *Mycoplasma Gallisepticum* en pollos de engorde: Suministrar 100 ppm de tiamulina (2 lb/TC de **Tiamuporc 10%**) en el alimento durante 5 a 7 días. **No utilizar en conjunto con coccidostatos ionóforos.**

Recomendaciones de uso

Para alimentos medicados tipo C (Alimento terminado), donde la dosis de inclusión de **Tiamuporc 10%**, sea menor a 4 lb/TC, se recomienda hacer una dilución previa a la adición en el alimento terminado.

Período de retiro

Se recomienda suprimir su uso al menos seis días antes del sacrificio.

Advertencias y precauciones

Utilizar únicamente en las especies indicadas en esta hoja técnica. Cualquier uso inadecuado de este producto, puede ser fatal.

No utilizar en alimentos que contengan coccidostatos ionóforos (Salinomicina, narasina, monensinas) y/o cloranfenicol.

No suministrar a gallinas en fase de postura.

Recomendaciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar y de aditivos no medicados.

Presentación

Funda de 25 Kg

Para uso veterinario exclusivamente.

Manufacturado y distribuido por
BIONORT-VET S.R.L
Licey al medio,
Santiago Rep. Dom.
[Tel:809-580-8610](tel:809-580-8610)
www.bionortvet.com

