

TIAMUPORC-S 10% 25 KG



Ficha Técnica del Producto

Composición:

Tiamulina.....50 gr
Sulfadimidina sódica.....150 gr
Excipientes, c.s.p.....1,000 gr

Indicaciones y vía de administración:

Premezcla antibiótica Tipo A de alta eficiencia en polvo, a base de tiamulina, dirigida al tratamiento de infecciones causadas por mycoplasma sp y otros microorganismos susceptibles a la tiamulina y sulfadimidina.

Cerdos: Control y tratamiento de infecciones causadas por *Haemophilus sp.*, *mycoplasma sp.*, *campylobacter spp.*, leptospira y otras enfermedades de origen bacteriano, tales como ileitis, clostriosis causadas por patógenos sensibles a tiamulina y sulfadimidina.

Aves: Prevención y control de *Mycoplasma Gallisepticum*, *sinovitis* infecciosa causada por *Mycoplasma syniviae*.

Direcciones de uso cerdos

- Control y tratamiento de infecciones causadas por *Haemophilus sp.*, *mycoplasma sp.*: Suministrar de 200 ppm de tiamulina y 600 ppm de sulfadimidina (6 - 8 lb/TC de **Tiamuporc S** premix) durante 5 a 7 días en el alimento terminado.

-Prevención de infecciones respiratorias: Suministrar de 50 -100 ppm de tiamulina y sulfadimidina (2 - 4 lb/TC de **Tiamuporc S** premix) durante 5 a 7 días en el alimento terminado en etapas de estrés del animal.

Direcciones de uso aves

-Prevención y control de *Mycoplasma Gallisepticum* en gallinas reproductoras y programas de ponedoras en etapa de levante: Suministrar de 200 ppm de tiamulina y 600 de sulfadimidina (8 lb/TC **Tiamuporc S**) en el alimento terminado durante períodos de choque de 5 a 7 diseñados por el médico veterinario.

-Prevención y control de *Mycoplasma Gallisepticum* en pollos de engorde: Suministrar 100 ppm de tiamulina y 300 ppm de sulfamidina (4 lb/TC de **Tiamuporc S**) en el alimento durante 5 a 7 días. **No utilizar en conjunto con coccidiostatos ionóforos.**

Recomendaciones de uso

Para alimentos medicados tipo C (Alimento terminado), donde la dosis de inclusión de **Tiamuporc S**, sea menor a 4 lb/TC, se recomienda hacer una dilución previa a la adición en el alimento terminado.

Período de retiro

Se recomienda suprimir su uso al menos seis días antes del sacrificio.

Advertencias y precauciones

Utilizar únicamente en las especies indicadas en esta hoja técnica. Cualquier uso inadecuado de este producto, puede ser fatal.

No utilizar en alimentos que contengan coccidiostatos ionóforos (Salinomocina, narasina, monensinas) y/o cloranfenicol.

No suministrar a gallinas en fase de postura.

Recomendaciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar y de aditivos no medicados.

Presentación

Funda de 25 Kg

Para uso veterinario exclusivamente.

Manufacturado y distribuido por BIONORT-VET S.R.L
Licey al medio,
Santiago Rep. Dom.
[Tel:809-580-8610](tel:809-580-8610)
www.bionortvet.com

