

Tilosina 10% 25 KG



Ficha Técnica del Producto

Composición:

Tilosina tartrato.....100 gr
Excipientes, c.b.p.....1,000 gr

Indicaciones y vía de administración:

Premezcla antibiótica Tipo A de alta eficiencia en polvo, a base de tilosina tartrato para ser utilizada en la elaboración de alimentos balanceados para aves y cerdos, en todas las etapas.

Cerdos: Control y tratamiento de la rinitis atrófica, disenterías relaciones con *Brachiospira hyodysenteriae*, control de enteropatías (ileitis asociada con *Lawsonia intracellularis*)

Aves: Prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias crónicas, sinusitis infecciosa, sinovitis infecciosas y como preventivo después de vacunaciones o cualquier estado de tensión. Control de patógenos en el TGI (Promotor de crecimiento). Prevención y control de *Mycoplasma Gallisepticum* en gallinas reproductoras y programas de ponedoras en etapa de levante.

Direcciones de uso cerdos

-Control y tratamiento de la rinitis atrófica: Suministrar 100 ppm de tilosina (2 lb/TC de **Tilosina 10%** premix) durante 7 a 15 días en el alimento terminado.

-Prevención y tratamiento de enteropatías Suministrar 100 ppm - 200 de tilosina (2-4 lb/TC de **Tilosina 10%** premix) durante 7 a 15 días en el alimento terminado.

Direcciones de uso aves

-Promotor de crecimiento: Suministrar de 50-100 ppm de tilosina (1-2 lb/TC de **tilosina 10%**) durante el ciclo completo de producción.

-Prevención y control de *Mycoplasma Gallisepticum* en gallinas reproductoras y programas de ponedoras en etapa de levante: Suministrar de 300 -500 ppm de tilosina (6-10 lb/TC **tilosina 10%**) en el alimento terminado durante períodos de choque diseñados por el médico veterinario.

-Prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias: Utilizar de 200-500 ppm de tilosina (De 2 a 10 lb/TC de **Tilosina 10%**) en el alimento terminado durante 5 a 10 días.

Recomendaciones de uso

Para alimentos medicados tipo C (Alimento terminado), donde la dosis de inclusión de **Tilosina 10%** premix, sea menor a 4 lb/TC, se recomienda hacer una dilución previa a la adición en el alimento terminado.

Período de retiro

Se recomienda suprimir su uso al menos seis días antes del sacrificio.

Advertencias y precauciones

Utilizar únicamente en las especies indicadas en esta hoja técnica. Cualquier uso inadecuado de este producto, puede ser fatal.

Recomendaciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar y de aditivos no medicados.

Presentación

Funda de 25 Kg

Para uso veterinario exclusivamente.

Manufacturado y distribuido por
BIONORT-VET S.R.L
Licey al medio,
Santiago Rep. Dom.
[Tel:809-580-8610](tel:809-580-8610)
www.bionortvet.com

