



Ficha Técnica del Producto

Composición:

Ciprofloxacina 100 gr
Amoxicilina HCl.....200 gr
Excipientes, c.s.p.....1,000 gr

Indicaciones y vía de administración:

Premezcla antibiótica Tipo A de alta eficiencia en polvo. Por su amplio espectro, **Bio-Amoxcipro** premix, está indicado para la prevención y tratamiento de infecciones respiratorias, digestivas, septicémicas y genito-urinarias causadas por bacterias Gram + y Gram -, tales como *Pausterella sp*, *E.Coli*, *Samonella sp*, *Haemophilus, pleroupneumoniae, staphilococcus sp*, *streptococcus sp*, *pseudomona sp*, *corynobacterium sp* y *Mycoplasma sp*.

Cerdos: Control y tratamiento de *Streptococcus suis*, *staphilococcus*, síndrome MMA, enteritis, *Haemophilus Parasuis*, necrosis de cola, dermatitis, salmonelosis, rinitis y demás enfermedades causadas por microorganismos sensibles a ambos principios activos.

Aves: Prevención y control de *Mycoplasma gallisepticum* y *M. sinoviae*; tratamiento de *Streptococcus sp* y *Staphilococcus sp*.

Direcciones de uso cerdos

- Prevención de *Mycoplasma en lechones*: Suministrar 500 ppm de amoxicilina y 250 de ciprofloxacina (5 lb/TC de **Bio-Amoxcipro** premix) como tratamiento preventivo durante las dos primeras semanas de alimentación en lechones destetados.

-Tratamiento de infecciones respiratorias y entéricas causadas por *E.Coli*, *Samonella spp*, *Haemophilus*, *pleroupneumoniae*, *staphilococcus spp*, *streptococcus spp*, *pseudomona spp*, *corynobacterium spp*: Suministrar 500 ppm de amoxicilina y 250 de ciprofloxacina (5 lb/TC de **Bio-Amoxcipro** premix) como medicación en el alimento durante 7 a 14 días continuos.

Direcciones de uso aves

-Tratamiento *Mycoplasma gallisepticum* y *sinoviae*: Suministrar 400 ppm de amoxicilina + 200 ppm de ciprofloxacina (4 lb/TC de **Bio-Amoxcipro** premix) en el alimento terminado durante 7-10 días.

-Tratamiento de necrosis de cabeza de fémur causada *Staphilococcus aureus*: Suministrar 400 ppm de amoxicilina + 200 ppm de ciprofloxacina (4 lb/TC de **Bio-Amoxcipro** premix) en el alimento terminado, durante siete días.

Recomendaciones de uso

Para alimentos medicados tipo C (Alimento terminado), donde la dosis de inclusión de **Bio-Amoxcipro** premix, sea menor a 4 lb/TC, se recomienda hacer una dilución previa a la adición en el alimento terminado.

Período de retiro

Se recomienda suprimir su uso al menos siete días antes del sacrificio.

Advertencias y precauciones

Utilizar únicamente en las especies indicadas en esta hoja técnica. Cualquier uso inadecuado de este producto, puede ser fatal.

Recomendaciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar y de aditivos no medicados.

Presentación

Fundas de 25 Kg

Para uso veterinario exclusivamente.

Manufacturado y distribuido por
BIONORT-VET S.R.L
Licey al medio,
Santiago Rep. Dom.
[Tel:809-580-8610](tel:809-580-8610)
www.bionortvet.com

