

BIO-AMOXI 10% 25 KG



Ficha Técnica del Producto

Composición:

Amoxicilina HCl.....100 gr
Excipientes, c.s.p.....1,000 gr

Indicaciones y vía de administración:

Premezcla antibiótica Tipo A de alta eficiencia en polvo. Actúa sobre la pared celular bacteriana, provocando la muerte del patógeno. Efectiva en el tratamiento de *Pasteurella sp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella sp.*, *Streptococcus sp.*, y *Staphylococcus sp.*, no productores de la penicilinas.

Cerdos: Control y tratamiento de infecciones bacterianas producidas por *Streptococcus suis*, y *staphylococcus enteritis*; necrosis de cola, dermatitis y salmonelosis

Aves: Prevención y tratamiento de *Pasteurella sp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella sp.*, *Streptococcus sp.*, y *Staphylococcus sp.*

Becerras: Tratamiento de artritis, onfalitis, infecciones causadas por *Escherichia coli*, *Salmonella sp.*, y *Pasteurella sp.*

Direcciones de uso cerdos

- Tratamiento de infecciones: Suministrar de 150 - 250 ppm de amoxicilina (3 - 5 lb/TC de **Bio-Amoxi** premix).

Direcciones de uso aves

- Tratamiento de necrosis de cabeza de fémur causada *Staphylococcus aureus*: Suministrar de 400 - 600 ppm de amoxicilina (4 -6 lb/TC de **Bio-Amoxi** premix) en el alimento terminado, durante siete días.

- Tratamiento infecciones por *E. Colli* y *Pausterella sp.*: Suministrar de 400 - 600 ppm de amoxicilina (4 -6 lb/TC de **Bio-Amoxi** premix) en el alimento terminado, durante siete días.

Direcciones de uso becerros

- Tratamiento de infecciones bacterianas: Suministrar de 100 - 200 ppm de amoxicilina (2 -4 lb/TC de **Bio-Amoxi** premix) en el alimento terminado, durante siete días.

Recomendaciones de uso

Para alimentos medicados tipo C (Alimento terminado), donde la dosis de inclusión de **Bio-Amoxi** premix, sea menor a 4 lb/TC, se recomienda hacer una dilución previa a la adición en el alimento terminado.

Período de retiro

Se recomienda suprimir su uso al menos siete días antes del sacrificio.

Advertencias y precauciones

Utilizar únicamente en las especies indicadas en esta hoja técnica. Cualquier uso inadecuado de este producto, puede ser fatal.

No suministrar a gallinas ponedoras en etapa de producción.

Recomendaciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar y de aditivos no medicados.

Presentación

Funda de 25 Kg.

Para uso veterinario exclusivamente.

Manufacturado y distribuido por
BIONORT-VET S.R.L
Licey al medio,
Santiago Rep. Dom.
[Tel:809-580-8610](tel:809-580-8610)
www.bionortvet.com

